



介紹您 嶄新的 成功配方

嶄新的**成功配方**簡單易行,能使植物繁殖生長迅速,促進花葉繁茂,提高芳醇度及精油生產,一階段一配方,在生長期和開花期內全程使用,去除了複雜的週式作法,普遍使用在商業量產上。

植株期



將培養基(土壤,泥煤,培養土等等),先行浸泡在配製有**Thrive Alive B-1 Red**的溶液中。
配方:以每4公升(1加侖)的水混合**12.5毫升(2½茶匙)**的**Thrive Alive B-1 Red**。

將每一植株根部浸在**Rootech Cloning Gel**中數秒後,立刻插入備好的培養基內。

苗木期



在接下來的七天裡,當植株生根後,在葉部噴灑一次配有**Thrive Alive B-1 Green**的溶液。
配方:以每4公升(1加侖)的水混合**20毫升(4茶匙)**的**Thrive Alive B-1 Green**。

在第二週,植株種下的10-12天後,用配有**SugarDaddy**的溶液噴灑植株,預備移植,同時促使植株生長蒼翠繁茂。

配方:以每4公升(1加侖)的水混合**10毫升(2茶匙)**的**SugarDaddy**。

生長期

光照: 18/6~ 開/關



一旦植株生根且發展根群,植株即準備好開始進行18小時的光照生長期。每週改變一次你的灌溉水,在生長期中每週持續供應下列的**生長力**配方,直到植株成長至你想要的高度。

生長力配方:以每4公升(1加侖)的水,混合下列營養物。

B.C Boost – 15 毫升 (3 茶匙)
B.C Grow – 7.5 毫升 (1½ 茶匙)
Thrive Alive B-1 Red – 2.5 毫升 (½ 茶匙)
MagiCal – 2.5 毫升 (½ 茶匙)
SugarDaddy – 10 毫升 (2 茶匙)

永遠先加BOOST

溶液的pH值 = 6.08 和 EC = 2.0 ms/s
(如果不是,調整 pH 值到 5.8 - 6.2) (ppm = 1100)

●在土壤/培養土環境中使用此一溶液的順序是**施肥,水,水,施肥**,在生長期中全程使用。
在水耕環境,溶液與每個灌溉周期一起供應。

開花期

光照: 12/12~ 開/關



一旦植株生根且發展根群,植株即準備好開始進行18小時的光照生長期。每週改變一次你的灌溉水,在生長期中每週持續供應下列的**開花**配方,直到植株成長至你想要的高度。

開花配方:以每4公升(1加侖)的水,混合下列營養物。

B.C Boost – 15 毫升 (3 茶匙)
B.C Bloom – 15 毫升 (3 茶匙)
Awesome Blossoms – 2.5 毫升 (½ 茶匙)
Thrive Alive B-1 Red – 2.5 毫升 (½ 茶匙)
MagiCal – 2.5 毫升 (½ 茶匙)
SugarDaddy – 12.5 毫升 (2½ 茶匙)

永遠先加BOOST

溶液的pH值 = 6.02 和 EC = 2.6 ms/s
(如果不是,調整 pH 值到 5.8 - 6.2) (ppm = 1430)

●在土壤/培養土環境中使用此一溶液的順序是**施肥,水,水,施肥**,在生長期中全程使用。
在水耕環境,溶液與每個灌溉周期一起供應。

收穫前期



在最後七天的開花期間應用下列**施肥**計畫,將使植株挺拔強勁,加強芳醇度以提高精油之生產。

★最初三天使用下列的**收穫前期**配方。

★最後四天沖灌調整了 pH 值的水。

收穫前期配方:以每4公升(1加侖)的水,混合下列營養物:

MagiCal – 2.5 毫升(½ 茶匙) **SugarDaddy** – 40 毫升(8 茶匙)

●在土壤/培養土環境,使用此一溶液的順序是**施肥,水,水,施肥**。
在水耕環境,溶液與每個灌溉周期一起供應。